

产品手册

H_LPA HEPG2 Cell Line

H_LPA HEPG2 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.12.1

目录

一、	产品基本信息及组分	3
二、	包装、运输及储存	3
三、	材料准备	3
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备	3
2.	试剂耗材准备	3
四、	细胞复苏、传代、冻存	4
1.	细胞复苏	4
2.	细胞传代（以 10 cm 皿为例）	4
3.	细胞冻存	4
五、	验证结果	5
1.	Elisa 检测蛋白表达	5
附录 1	H_LPA 氨基酸序列（P08519 2022-02-23 v2）	6
使用许可协议：		8

一、产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C48323	H_LPA HEPG2 Cell Line	5E6 Cells/mL

组成成分

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C48323	H_LPA HEPG2 Cell Line	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关实验，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	MEM+10% FBS+1% P.S
细胞生长培养基:	MEM+10% FBS+1% P.S+1 µg/mL Puromycin
细胞冻存液:	90% FBS+10% DMSO

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
MEM	500 mL	Viva Cell/C3050-0500
Fetal Bovine Serum	500 mL	ExCell/FSP500
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Puromycin	25 mg	Genomeditech/GM-040401-1
Human LP-a(Lipoprotein A) ELISA Kit	48T	elabscience/E-EL-H0160

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
光吸收型单功能酶标仪	Molecular Devices/CMax Plus

四、细胞复苏、传代、冻存

1. 细胞复苏

- 37°C 恒温水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C 恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇晃解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 75% 乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀， $176 \times g$ ，离心 5 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加复苏培养基的形式，调整活细胞密度到 $3-4 \times 10^5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

3. 细胞冻存

- 使用 $176 \times g$ ，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS+10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 Cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C 下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代（以 10 cm 皿为例）

注：细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 此细胞呈上皮细胞样，贴壁生长。培养箱中孵育 16-24 h 后，镜下观察细胞贴壁情况。当细胞密度大于 90%，即可进行细胞传代。推荐细胞传代比例为 1:2-1:3，3-6 天传代。
- 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37°C 消化 5-10 min，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右生长培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来， $176 \times g$ 室温离心 3 min。
- 弃上清，细胞沉淀用生长培养基重悬，根据传代前细胞密度分盘（根据培养皿面积和细胞密度计算，传代后细胞密度为 35-50%）。

注意事项：

- Hep G2 细胞呈团块生长，细胞传代消化过程中需细胞团块完全脱落后，方可终止消化，否则细胞容易发生聚集。
- Hep G2 细胞对血清敏感，需配合高质量血清使用。
- FBS 血清需 56°C 加热 30 分钟，可灭活补体和部分病毒，但不显著影响大多数生长因子和细胞因子活性。

五、 验证结果

1. Elisa 检测蛋白表达

操作步骤可调整优化，对于本实验，实验前，将细胞以 2×10^5 cells/mL的密度接种，待其生长稳定后，约3 d，实验当天收集细胞上清液，作为待测样品。

使用Human LPA ELISA Kit，按以下步骤操作：

a)加样：试剂室温平衡 20 min。各孔加入 100 μ L 梯度标准品或稀释后待测样品，空白孔加 100 μ L 样品稀释液。沿孔壁加样，勿产生气泡。

b)孵育与洗板：封板，37 $^{\circ}$ C孵育 90 min，甩干液体，不洗涤，直接每孔加 100 μ L 生物素化抗体工作液，封板 37 $^{\circ}$ C再孵育 60 min。甩干，每孔加洗涤液洗板 3 次，拍干。

c)加酶：每孔加 100 μ L HRP 酶结合物工作液，封板后 37 $^{\circ}$ C孵育 30 min。孵育结束洗板 5 次，彻底拍干。

d)显色及终止：每孔加 90 μ L TMB 底物，37 $^{\circ}$ C避光显色 15 min。随后每孔加 50 μ L 终止液，液体由蓝变黄即终止。

e)检测及计算：终止后 15 分钟内，酶标仪 450 nm 测 OD 值，以空白孔调零，代入标准曲线计算浓度并乘以稀释倍数。




Fig1. LPA expression analysis in H_LPA HEPG2 Cell Line (Cat. GM-C48323) by ELISA. Cell culture supernatant was collected from wild-type HEPG2 and H_LPA HEPG2 Cell Line. Expression level of human LPA were analyzed by ELISA (Human LP-a(Lipoprotein A) ELISA Kit/elabsience/E-EL-H0160).

附录1 H_LPA 氨基酸序列 (P08519 2022-02-23 v2)

MEHKEVVLLLLLFLKSAAPEQSHVVQDCYHGDGQSYRGTYSTTVTGRTCQAWSSMTPH
QHNRTTENYPNAGLIMNYCRNPDAVAAPYCYTRDPGVRWEYCNLTQCSDAEGTAVAPP
TVTPVPSLEAPSEQAPTEQRPQVQECYHGNGQSYRGTYSTTVTGRTCQAWSSMTPHSHSR
TPEYYPNAGLIMNYCRNPDAVAAPYCYTRDPGVRWEYCNLTQCSDAEGTAVAPPTVTPV
PSLEAPSEQAPTEQRPQVQECYHGNGQSYRGTYSTTVTGRTCQAWSSMTPHSHSRTPEYY
PNAGLIMNYCRNPDAVAAPYCYTRDPGVRWEYCNLTQCSDAEGTAVAPPTVTPVPSLEA
PSEQAPTEQRPQVQECYHGNGQSYRGTYSTTVTGRTCQAWSSMTPHSHSRTPEYYPNAG
LIMNYCRNPDAVAAPYCYTRDPGVRWEYCNLTQCSDAEGTAVAPPTVTPVPSLEAPSEQ
APTEQRPQVQECYHGNGQSYRGTYSTTVTGRTCQAWSSMTPHSHSRTPEYYPNAGLIMN
YCRNPDAVAAPYCYTRDPGVRWEYCNLTQCSDAEGTAVAPPTVTPVPSLEAPSEQAPTE
QRPQVQECYHGNGQSYRGTYSTTVTGRTCQAWSSMTPHSHSRTPEYYPNAGLIMNYCRN
PDAVAAPYCYTRDPGVRWEYCNLTQCSDAEGTAVAPPTVTPVPSLEAPSEQAPTEQRPQ
VQECYHGNGQSYRGTYSTTVTGRTCQAWSSMTPHSHSRTPEYYPNAGLIMNYCRNPDA
VAAPYCYTRDPGVRWEYCNLTQCSDAEGTAVAPPTVTPVPSLEAPSEQAPTEQRPQVQE
CYHGNGQSYRGTYSTTVTGRTCQAWSSMTPHSHSRTPEYYPNAGLIMNYCRNPDPVAAP
YCYTRDPVSRWEYCNLTQCSDAEGTAVAPPTITIPVPSLEAPSEQAPTEQRPQVQECYHGNG
QSYQGTYFITVTGRTCQAWSSMTPHSHSRTPAYYPNAGLIKNYCRNPDPVAAPWCYTDD
PSVRWEYCNLTRCSDAEWTAFFVPPNVILAPSLEAFFEQALTEETPGVQDCYHYGQSYRG
TYSTTVTGRTCQAWSSMTPHQHSRTPENYPNAGLTRNYCRNPDAEIRPWCYTMDPSVRW
EYCNLTQCLVTESSVLATLTVVPDPSTEASSEEAPTEQSPGVQDCYHGDGQSYRGSFSTTV
TGRTCQSWSSMTPHWHQRTTEYYPNGGLTRNYCRNPDAEISPCWCYTMDPNVRWEYCNLT
TQCPVTESSVLATSTAVSEQAPTEQSPVQDCYHGDGQSYRGSFSTTVTGRTCQSWSSMT
PHWHQRTTEYYPNGGLTRNYCRNPDAEIRPWCYTMDPSVRWEYCNLTQCPVMESTLLT
TPTVVPVPSTELPSEEAPTENSTGVQDCYRGDQSYRGTLSTTITGRTCQSWSSMTPHWH
RRIPLYYPNAGLTRNYCRNPDAEIRPWCYTMDPSVRWEYCNLTRCPVTESSVLTTPTVAP
VPSTEAPSEQAPPEKSPVVQDCYHGDGRSYRGISSTTVTGRTCQSWSSMIPHWHQRTPEN
YPNAGLTENYCRNPDSGKQPWCYTDDPCVRWEYCNLTQCSETESGVLETPTVVPVPSME
AHSEAAPTEQTPVVRQCYHGNGQSYRGTFSTTVTGRTCQSWSSMTPHRHQRTPENYPND

GLTMNYCRNPDADTGPWCFTMDPSIRWEYCNLTRCSDTEGTVVAPPTVIQVPSLGPPSEQ
DCMFGNGKGYRGKKATTVTGTPCQEWAAQEPHRHSTFIPGTNKWAGLEKNYCRNPDGD
INGPWCYTMNPRKLFDYCDIPLCASSSFDCGKPQVEPKKCPGSIVGGCVAHPHSWPWQVS
LRTRFGKHFCGGTLISPEWVLTAHCLKKSSRPSSYKVILGAHQEVNLESHVQEIEVSRLF
LEPTQADIALLLKSRPAVITDKVMPACLPSPDYMVTARTECYITGWGETQGTFTGTLLE
AQLLVIENEVCNHYKYICAEHLARGTDSCQGDSGGPLVCFEKDKYILQGVTSWGLGCAR
PNKPGVYARVSRFVTWIEGMMRNN*

Genomeditech

使用许可协议：

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策：

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。
- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅可在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。