

产品手册

H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line

H_GLP1R Reporter CHO-K1 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.8.4

目录

一、	产品基本信息及组分	3
二、	包装、运输及储存	3
三、	产品描述	4
四、	材料准备	5
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备	5
2.	试剂耗材准备	5
五、	细胞复苏、传代、冻存	6
1.	H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 细胞复苏	6
2.	H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 细胞传代	6
3.	H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 细胞冻存	6
六、	使用方法	7
1.	激动剂激活实验	7
1)	加样步骤	7
2)	报告基因检测	8
3)	验证结果	8
2.	Block 抗体抑制实验	9
1)	加样步骤	9
2)	报告基因检测	10
3)	验证结果	11
	使用许可协议:	12

一、 产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C09150	H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line	5E6 Cells/mL

组成成分

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C09150	H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、 包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关 Assay，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、 产品描述

胰高血糖素样肽-1 受体(GLP-1R)是在胰腺细胞和大脑神经元上发现的一种受体蛋白。在人类中，它是由位于 6 号染色体上的 GLP1R 基因合成的。它是 G 蛋白偶联受体中胰高血糖素受体家族的成员。

被激活的 GLP-1R 刺激腺苷酸环化酶通路，导致胰岛素合成和胰岛素释放增加。因此，GLP-1R 一直是开发治疗糖尿病药物(通常称为 GLP1R 激动剂)的目标。GLP-1R 也在大脑中表达，参与控制食欲。

GLP-1R 是一种多效性偶联受体，N 端识别特异性的配体，通过与多种 G 蛋白 (Gas、Gai、Gao 和 Gaq/11) 偶联来调控细胞通路。当与 GLP-1(7-37)结合后，G 蛋白 α 亚基与 β 、 γ 亚基解离，Gas 蛋白偶联，激活腺苷环化酶 (cAMP)，促使 cAMP 在细胞内含量升高并增加蛋白激酶 A (PKA) 的含量，激活下游信号通路，引起胰岛素基因转录增加。

吉满生物 H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 报告基因细胞系，是基于 cAMP-PKA 信号通路构建的一种 Luciferase 报告基因细胞系。当 GLP-1(7-37)与其受体结合时，亚基互相解离。Gas 蛋白偶联，激活腺苷环化酶，促使 cAMP 在细胞内含量升高并增加 PKA 的含量。激活下游信号通路，从而激活荧光素酶 (Luciferase) 的表达。Luciferase 读值即代表信号通路的激活效果，因此可用于 GLP1R 相关药物的体外效果评价。




Fig 1.原理示意图

四、 材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	F12K+10% FBS+1% P.S
细胞生长培养基:	F12K+10% FBS+1% P.S+4 µg/mL Blasticidin+4 µg/mL Puromycin
细胞冻存液:	90% FBS+10% DMSO
Assay Buffer:	F12K+1% FBS+1% P.S

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
Puromycin	25 mg	Genomeditech/ GM-040401-1
Blasticidin	10 mg	Genomeditech / GM-040404-1
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Fetal Bovine Serum	500 mL	Thermo/10099141
F12K	500 mL	BOSTER/PYG0036
96 Well Clear V-Bottom Tissue Culture	96-well	Corning/3894
96 well round well culture plate	96-well	NEST/701001
96 well White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate	96-well	Corning/3912
ONE-Glo™ Luciferase Assay System	50 mL	Promega/E6120
GLP-1(7-37)	/	MCE/HY-P0055
Anti-GLP1R hIgG1 Antibody	/	Genomeditech/GM-51168AB

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
酶标仪	Moleculardevices/SpectraMax L

五、 细胞复苏、传代、冻存

1. H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 细胞复苏

- 37°C水浴锅预热培养基，加入预热后的完全培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下不断摇动至融化。
- 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀，1000 rpm，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 完全培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加完全培养基的形式，调整活细胞密度到 $2 - 3 \times 10^5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

2. H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 细胞传代

- 当细胞密度大于 60%时，即可进行传代。推荐细胞传代比例为 1:4 - 1:5，2-3 天传代传代。
- 将皿或培养瓶中的培养基弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液润洗一遍，吸弃，再次吸取 1 mL 消化液，37°C 消化 2 - 3 min，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右完全培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来，1000 rpm 室温离心 3 min。
- 弃上清，细胞沉淀用完全培养基重悬，根据传代前细胞密度分盘（根据培养皿面积和细胞密度计算，传代后细胞密度为 20 - 30%）。

3. H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 细胞冻存

- 使用 1000 rpm，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

六、使用方法

1. 激动剂激活实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 细胞量为 1.5×10^4 Cells/孔。本次实验使用 GLP-1(7-37) (3355.67 Da) 作为阳性药物，Conc.01 浓度为 $1 \mu\text{g/mL}$ ，3 倍梯度稀释，Conc.01-Conc.10 分别排布在 B2-B11，B12 为 0 浓度对照。周围为 $100 \mu\text{L}$ PBS，以防止边孔蒸发。

孔板布局：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
B	GLP-1(7-37)	1 $\mu\text{g/mL}$	333.33 ng/mL	111.11 ng/mL	37.04 ng/mL	12.35 ng/mL	4.12 ng/mL	1.37 ng/mL	457.25 pg/mL	152.42 pg/mL	50.81 pg/mL	0
C	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
D												
E												
F												
G												
H												

1) 加样步骤

- 在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为 1.5×10^5 cells/mL。以排枪加 $100 \mu\text{L}$ 细胞/孔至中间孔。周围的孔加 $100 \mu\text{L}$ PBS。盖上板盖，于孵箱中孵育过夜使用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测药物，使用一行（如 B2-B11）。
- 母液配置

药物名称	储液	母液	配置方法
GLP-1(7-37)	10 mg/mL	0.1 mg/mL	取 $2 \mu\text{L}$ 储液+ $198 \mu\text{L}$ Assay Buffer

- 96 孔 V 底板中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B2 孔加入 $163.3 \mu\text{L}$ Assay Buffer，B3-B12 孔，加入 $110 \mu\text{L}$ Assay Buffer。
- 吸取不同体积的待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B2 中加入 $1.65 \mu\text{L}$ GLP-1(7-37)），混匀。

	母液吸取	梯度稀释孔, 依次从前孔吸取 55 μL , 加入次孔										对照孔
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B	1.65 μL GLP-1(7-37)	加入	163.3 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL
C												
D												
E												
F												
G												
H												

- g) 从第 1 个梯度稀释孔 B2 中吸取 55 μL , 加入到第 2 个梯度稀释孔 B3, 充分混匀。
- h) 以此类推, 直至第 10 个梯度稀释孔 (B11)。
- i) 将步骤 a 孵育过夜的孔板取出, 每孔吸弃 90 μL 培养基。
- j) 加入之前准备好的梯度稀释液, 每孔 100 μL 。
- k) 盖上班盖, 于 37 $^{\circ}\text{C}$ CO_2 培养箱中培养 7 h。
- l) 使用 ONE-GloTM 报告基因检测试剂盒, 检测 Luciferase。

2) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line	0 $\mu\text{g/mL}$	1 $\mu\text{g/mL}$	16.94 $\mu\text{g/mL}$
	331137	21976487	311211

3) 验证结果




Fig 2.功能验证结果

(右图对药物进行质量浓度和摩尔浓度的换算后绘制)

2. Block 抗体抑制实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line 细胞量为 1.5×10^4 Cells/孔。本次实验使用 GLP-1(7-37) (3355.67 Da) 作为激活药物（激活终浓度为每孔 10 ng/mL）以及 Anti-GLP1R hIgG1 Antibody（以下简称为 Anti-GLP1R; 150 kDa）作为 block 抗体, Conc.01 终浓度为 100 $\mu\text{g/mL}$, 3 倍梯度稀释, Conc.01-Conc.09 分别排布在 B2-B10, B11 为 0 浓度对照。周围为 100 μL PBS, 以防止边孔蒸发。

孔板布局:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
B	Anti-GLP1R	100 $\mu\text{g/mL}$	33.33 $\mu\text{g/mL}$	11.11 $\mu\text{g/mL}$	3.7 $\mu\text{g/mL}$	1.23 $\mu\text{g/mL}$	411.52 ng/mL	137.17 ng/mL	45.72 ng/mL	15.24 ng/mL	0	PBS
C	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
D												
E												
F												
G												
H												

1) 加样步骤

- 在实验前 16-24 h, 将细胞从培养瓶中取出, 消化离心收集细胞沉淀, 使用适量完全培养基重悬细胞, 检测细胞活力并计数, 再以完全培养基调整细胞浓度为 1.5×10^5 cells/mL。以排枪加 100 μL 细胞/孔至中间孔。周围的孔加 100 μL PBS。盖上板盖, 于孵箱中孵育过夜使用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测药物, 使用一行 (如 B2-B10)。
- 母液配置

药物名称	储液	母液	配置方法
GLP-1(7-37)	10 mg/mL	0.01 mg/mL	取 2 μL 储液+1998 μL Assay Buffer
Anti-GLP1R	2.17 mg/mL	/	直接使用储液

- 96 孔 V 底板中, 加入 Assay Buffer, 各孔体积见下表, 如 B2 孔加入 74.9 μL Assay Buffer, B3-B11 孔, 加入 55 μL Assay Buffer。
- 吸取不同体积的待测样品母液, 加入到第一个梯度稀释孔中 (如 B2 中加入 7.6 μL Anti-GLP1R), 混匀。

母液吸取		梯度稀释孔, 依次从前孔吸取 27.5 μ L, 加入次孔										对照孔
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B	7.6 μ L Anti-GLP1R	加入	74.9 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	
C												
D												
E												
F												
G												
H												

- g) 从第 1 个梯度稀释孔 B2 中吸取 27.5 μ L, 加入到第 2 个梯度稀释孔 B3, 充分混匀。
- h) 以此类推, 直至第 9 个梯度稀释孔 (B10)。
- i) 将步骤 a 孵育过夜的孔板取出, 每孔吸弃 90 μ L 培养基。加入之前准备好的梯度稀释液, 每孔 50 μ L, 盖上盖板, 在培养箱中孵育 1 h。
- j) 此时配置激活药物 GLP-1(7-37) ($2 \times$ 激活浓度), 取 1.7 μ L 稀释后的母液, 加入到 823.4 μ L 的 Assay Buffer 中, 混匀。
- k) 1 h 后, 将步骤 i 的细胞孔板取出, 加入步骤 j 配置好的激活药物, 每孔 50 μ L。
- l) 盖板上盖, 于 37 $^{\circ}$ C CO₂ 培养箱中培养 6 h。
- m) 使用 ONE-Glo™ 报告基因检测试剂盒, 检测 Luciferase。

2) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line+Anti-GLP1R	GLP-1(7-37) + No Ab Control	GLP-1(7-37) + 100 μ g/mL Anti- GLP1R	GLP-1(7-37) + 15.24 ng/mL Anti-GLP1R
	5734728	252093	5393917

3) 验证结果




Fig 3.抗体抑制验证结果
 (右图对抗体进行质量浓度和摩尔浓度的换算后绘制)

使用许可协议：

吉满生物将其许可材料的所有知识产权，独占的、不可转让的和不可发放分许可的权利授予给被许可人；吉满生物将保留许可材料、细胞系历史包、子代、包括修改材料中许可材料的所有权。

在吉满生物和被许可方之间，被许可方不允许以任何方式修改细胞系。被许可方不得分享、分发、出售、再授权或以其他方式将被许可材料、子代提供给其它实验室、部门、研究机构、医院、大学或生物技术公司等第三方非基于外包被许可人的研究目的而使用。

详情请参考吉满细胞系授权协议。

Genomeditech